

FUNGICIDA

GRUPO 3

TEBUCONAZOLE
DELTA
AGRO

Suspensión concentrada

Composición:

tebuconazole: alfa-[2-(4 clorofenil)etil]-alfa-(1-1 dimetiletil)-1 H-1,2,4 triazol-1 etanol 43 g
inertes, c.s.p. 100 cm³

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES
DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en el SENASA con el N° 39.920

N° de lote: ver en envase

Fecha de Vencimiento: ver en envase

Industria Argentina

NO INFLAMABLE

Contenido neto:

5 Litros

Registrado por: Agroinsumos ByL S.A. / Pellegrini 205 2° Piso
Cañada de Gómez / Santa Fe / Argentina
03471-422238 / www.agroinsumosbyl.com.ar

Advertencia: Agroinsumos ByL S.A. no se responsabiliza por los daños que pueda ocasionar el uso de este producto distinto al indicado en este rótulo.

04/039920/Bx5/FO/PR/Rev 0



CUIDADO



agua y jabón neutro. Contacto ocular: si el paciente usa lentes de contacto, retirarlas. Lavar con abundante agua limpia por espacio de 15 minutos manteniendo los párpados separados y haciendo mover lentamente los ojos en todas las direcciones, luego control por oftalmólogo. En caso de inhalación: alejar al paciente del lugar de exposición, remover inmediatamente al aire fresco y obtener atención médica. Si es necesario, efectuar respiración artificial, si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. En todos los casos procurar asistencia médica.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO. CLASE

III. No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Categoría Inhalatoria III Cuidado

No irritante ocular. No irritante dermal. No sensibilizante dermal.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Náuseas, vómitos, malestar general, cefalea, irritación ocular, lagrimeo.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

- Hospital Pedro de Elizalde: Montes de Oca 40 (C1270AAN) Cap. Fed. - Tel.: 4300-2115 y 4307-5842.

- Hospital de Clínicas J. de San Martín: Córdoba 2351 (C1120AAF) Cap. Fed. - Tel.: 5950-8806/8804 conmutador: 5950-8000.

- Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed. - Tel.: 4962-2247/6666.

- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n Palomar, Bs. As. - Tel.: 4658-7777/4654-6648.

GENERALIDADES: TEBUCONAZOLE DELTA AGRO es un fungicida orgánico que pertenece al grupo de los triazoles. Posee acción preventiva, curativa y erradicante. Inhibe la biosíntesis del ergosterol del hongo. Es sistémico porque es absorbido y redistribuido en el interior de la planta. Posee un amplio espectro de acción destacándose en el control de enfermedades en trigo y otros cereales como fusariosis, septoriosis, royas y oidios, aumentando el rendimiento y calidad de la cosecha.

INSTRUCCIONES DE USO: Antes de abrir el envase, agitarlo para homogeneizar su contenido.

Preparación: preparar la cantidad requerida de TEBUCONAZOLE DELTA AGRO y adicionar al tanque de la pulverizadora a medio llenar y luego completar a volumen total. Verificar que el sistema de agitación funcione desde el vertido del producto al tanque hasta el final de la aplicación. Utilizar el producto el mismo día de su preparación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: TEBUCONAZOLE DELTA AGRO puede aplicarse con equipos pulverizadores terrestres y aéreos. En aplicaciones terrestres no aplicar menos de 150 l/ha. En aplicaciones aéreas el volumen mínimo debe ser de 15 l/ha y en frutales aplicar caudales de 1000 a 1200 l/ha. Lograr una buena cobertura del producto sobre el cultivo a tratar, 20 a 30 gotas/cm² de follaje. Suspender los tratamientos con vientos superiores a 10 km/hora y evitar la aplicación aérea sobre ríos, arroyos y lagunas.

RECOMENDACIONES DE USO:

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto con la piel, los ojos, e inhalación, como así también la contaminación con alimentos. Usar ropa protectora adecuada, guantes, botas, máscara durante la preparación y aplicación. Luego de utilizar el producto lavar muy bien todas las partes expuestas del cuerpo con abundante agua y jabón y asegurarse un correcto lavado de las prendas que hayan tenido contacto con el producto antes de ser usadas nuevamente. No aspirar las gotas de la aspersión. No comer, no beber y no fumar durante la aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Lavar todos los utensilios y destruir los envases vacíos.

RIESGOS AMBIENTALES: TOXICIDAD PARA AVES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. El producto no presenta riesgos para el medio ambiente si se usa siguiendo las recomendaciones de este marbete. TOXICIDAD PARA PECES: MUY TÓXICO; no contaminar fuentes ni cursos de agua superficiales ni subterráneos con el enjuague de los equipos de aplicación. Dejar un mínimo de 80 metros entre el área tratada y el espejo de agua. TOXICIDAD PARA ABEJAS: VIRTUALMENTE NO TÓXICO. Avisar a los apicultores cercanos por el cierre de colmenas previo a la aplicación. No aplicar sobre abejas trabajando.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Después de la aplicación se deben limpiar correctamente las máquinas e implementos con abundante agua. Los restos del caldo de aplicación no deben arrojarse a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc) y pueden aplicarse diluidos con agua sobre alambrados y zonas no cultivadas.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Una vez usados los envases deben someterse al triple lavado e inutilizarse por perforación y enviarlos a Centros de Acopio autorizados que efectuarán la disposición final.

ALMACENAMIENTO: Almacenar el producto en su envase original en lugar fresco y seco, sobre elevado del suelo en tarimas, ventilado, a cubierto de los rayos solares, calor, humedad y alejado de alimentos, semillas, fertilizantes, fuentes de agua, y fuera de la casa.

DERRAMES: En caso de producirse un derrame absorber el producto con cal, aserrín, tierra u otro material absorbente y colocarlo en un recipiente bien cerrado e identificado para su posterior eliminación. Evitar contaminar alcantarillas, depósitos o cursos de agua.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión accidental dar a beber dos vasos de agua. Nunca administrar nada por boca ni inducir al vómito a una persona inconsciente. Llamar a un médico. Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de aplicación
Trigo	Fusarium o Golpe blanco del trigo (<i>Fusarium graminearum</i>)	350-450 cm ³ /ha	Aplicar en forma preventiva a la espiga en floración.
	Mancha amarilla (<i>Drechslera tritici repentis</i>); Mancha de la hoja del trigo (<i>Septoria tritici</i>); Roya (<i>Puccinia recondita</i>); Oidio (<i>Erysiphe graminis tritici</i>)		Al observar las primeras pústulas o manchas.
Duraznero	Podredumbre morena de los frutales (<i>Monilia fruticola</i> , <i>Monilia laxa</i>)	30 cm ³ /100 L. de agua	Realizar dos aplicaciones: 30 y 15 días antes de la cosecha. Ante la observación de condiciones predisponentes, realizar aplicaciones adicionales principalmente en floración. Rotar con productos de diferente grupo químico. Posee efecto protector post-cosecha.
Manzano	Sarna del manzano (<i>Venturia inaequalis</i>)	20 cm ³ /100 L. de agua	Aplicar de acuerdo a las condiciones climáticas predisponentes o a los servicios de alarma disponibles. Rotar o combinar con productos de diferente grupo químico.
Clavel. Crisantemo. Plantas Ornamentales. Rosal	Manchas florales Royas, Oidios	500-700 cm ³ /ha	Pulverizar el follaje ante la aparición de las primeras manchas.
Soja	Mancha marrón (<i>Septoria glycines</i>); Mancha púrpura (<i>Cercospora kikuchii</i>); Mancha ojo de rana (<i>Cercospora sojina</i>); Mancha anillada (<i>Corynespora cassicola</i>); Oidio (<i>Microsphaera diffusa</i>); Antracnosis (<i>Colletotrichum truncatum</i>); Phomopsis (<i>Diaporthe phaseolorum</i>)	200-300 cm ³ /ha	Aplicar desde inicio de formación de vainas, R3 o en R5-R6 para obtener calidad de grano
	Roya de la Soja (<i>Phakopsora pachyrhizi</i>)	230 cm ³ /ha	Antes de la aparición de los primeros síntomas

RESTRICCIONES DE USO: entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir: 7 días para durazno y 35 días para trigo y manzano. Soja: 30 días. Florales y ornamentales: sin restricciones.

"En caso que el producto o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período máximo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".

COMPATIBILIDAD: TEBUCONAZOLE DELTA AGRO generalmente se utiliza solo. Incompatible con productos de reacción alcalina. No mezclarlo con concentrados emulsionables.

FITOTOXICIDAD: TEBUCONAZOLE DELTA AGRO a las dosis indicadas no es fitotóxico para los cultivos en los cuales se recomienda.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO



CUIDADO

