

PRECAUCIONES:
- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.
LEAA TENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evítese el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Durante la preparación y aplicación use guantes y botas de goma, máscara con respirador apropiado para pesticidas y ropa protectora adecuada (pantalón largo y chaqueta de mangas largas). No comer, beber o fumar durante el tratamiento. Lávese cuidadosamente con jabón y agua después de la aplicación. No utilice equipos con pérdidas. No destape picos, orificios, válvulas, cañerías, etc. con la boca.
RIESGOS AMBIENTALES: ABEJAS: Moderadamente tóxico.
ORGANISMOS ACUÁTICOS: Muy tóxico. No aplicar **CLORFENAPIR 24 DELTA AGRO** en forma terrestre dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. Deriva o escurrimiento desde áreas tratadas con **CLORFENAPIR 24 DELTA AGRO** hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación puede resultar peligroso para organismos acuáticos. No se halla autorizada la aplicación aérea de este producto.
AVES: Muy tóxico. De acuerdo a la evaluación realizada este producto presenta un riesgo tolerable para las aves, en relación al uso y dosis autorizados por el SENASA e indicados en este marbete.
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Vacíe completamente el envase en el equipo de aplicación y efectúe un triple lavado del mismo. El agua proveniente de esta limpieza se agregará al tanque de la pulverizadora para ser utilizado en la tarea prevista. Luego de realizar el triple lavado de los envases, elimínelos de acuerdo a lo indicado en el cuadro “Eliminación de envases vacíos”. Los remanentes del caldo y del lavado de envases y equipo aplicador, puede aplicarse sobre zonas no cultivadas y alejados de centros poblados y de tránsito frecuente de personas y animales domésticos.
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Efectuar un triple lavado antes de proceder a la destrucción de los envases. Los envases deben ser inutilizados por perforación y posteriormente eliminados mediante empresas habilitadas para tal fin. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seco, fresco y bajo llave, alejado de alimentos.
DERRAMES: Recoja el líquido derramado con un material absorbente como arena, aserrín, tierra o elementos específicos para contención de derrames y recolecte el material en containers cerrados e identificados para su posterior incinerado. Luego enjuague el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.
PRIMEROS AUXILIOS: Procurar asistencia médica y mostrar la etiqueta del producto. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas según la vía de exposición al producto: **En caso de ingestión:** No provocar el vómito pero tampoco impedirlo si ocurre espontáneamente. Dar a beber abundante agua. No suministrar leche, aceite ni sustancia grasa alguna. No administrar nada por boca a una persona inconsciente. Procurar atención médica inmediata. **Contacto con la piel:** Quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel y cabellos con abundante agua y jabón neutro o agua bicarbonatada (diluir una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en un litro de agua). **Contacto ocular:** Inmediatamente lavar los ojos con agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos. **En caso de inhalación:** Trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Mantener a la persona quieta y acostada, cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio.”

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:
Clase toxicológica (OMS 2009): Producto Moderadamente Peligroso – Clase II
Toxicidad inhalatoria: Categoría III – Cuidado
Irritación ocular: Leve irritante ocular (Cuidado) **Categoría IV**
No irritante dermal. No sensibilizante dermal.
En caso de accidentes aplicar tratamiento sintomático. No hay antídoto específico.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No se han encontrado descripciones de intoxicaciones en el uso laboral de este producto. No es irritante dermal y es levemente irritante ocular.
ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: - Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez. / Tel.: (011) 4962-6668 /4962-2247. Conmutador: 4962-9280/9212
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas. / Tel.: (011) 4654-6648/ 4658-7777. Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03) - Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas José de San Martín. / Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806 - TAS-Rosario, Prov de Santa Fe. / Tel.: (0341) 424-2727

INSECTICIDA - ACARICIDA
GRUPO 13A

CLORFENAPIR 24
DELTA AGRO

Suspensión Concentrada

Composición:

clorfenapir: 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrol-3-carbonitrilo	24 g
Inertes y coadyuvantes c.s.p.	100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL FOLLETO
ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscrito en SENASA con el N° 41.191

LOTE: ver en envase
VENCIMIENTO: ver en envase
Origen China
No inflamable

Contenido neto: 5 Litros

Registrado por: Agroinsumos ByL S.A.
Pellegri 205 2º Piso / Cañada de Gómez / Santa Fe / Argentina
03471-422238 / www.agroinsumosbyl.com.ar

Advertencia: Agroinsumos ByL S.A. no se responsabiliza por los daños que pueda ocasionar el uso de este producto distinto al indicado en este rótulo.

02/04/1191/Bx5/FO/FM/Rev 0



NOCIVO



GENERALIDADES: CLORFENAPIR 24 DELTA AGRO® es un Acaricida-Insecticida que actúa por ingestión y contacto. Como una práctica general de manejo de resistencia, este producto debe ser aplicado secuencialmente a otros productos registrados que tengan modos de acción diferentes. **CLORFENAPIR 24 DELTA AGRO®**, se recomienda en el cultivo de cultivo de Soja para control de *Anticarsia gemmatalis*, *Rachiplusia nu* y *Chrysodeixis includens*. En el cultivo de Tomate para el control de Polilla del tomate *Tuta absoluta* y en el cultivo de Algodón para el control de Oruga de la hoja *Alabama argillacea*.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación: Llenar parcialmente con agua el tanque de la mochila de aplicación o la pulverizadora (manteniendo el sistema de agitación en funcionamiento), agregar la cantidad recomendada de **CLORFENAPIR 24 DELTA AGRO®** y completar el volumen de agua. No deje el caldo preparado de un día para otro. SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Para el cultivo de **Tomate**, **CLORFENAPIR 24 DELTA AGRO®** debe ser aplicado con mochilas de presión manual o motopulverizadoras con mangueras y lanzas de alta presión (entre 80 y 200 lbs/pg³) y el mojado debe ser hasta punto de goteo cubriendo totalmente la planta. El volumen de agua necesario estará en función del tamaño del cultivo pudiendo variar de 500 a 2000 litros por hectárea. Para el cultivo de **Algodón**, **CLORFENAPIR 24 DELTA AGRO®** se aplicará con pulverizadoras terrestres, asperjando como mínimo 100 litros por hectárea. Utilizar pastillas de cono hueco y presión entre 40-60 lbs/pg². Realizar una adecuada cobertura del cultivo según el estado de desarrollo del mismo y según la ubicación de la plaga.
CLORFENAPIR 24 DELTA AGRO® actúa sobre todos los estadios larvales de *Alabama argillacea* pero se obtiene una eficacia máxima cuando las aplicaciones se dirigen a los primeros estadios larvales de la misma. **CLORFENAPIR 24 DELTA AGRO®** controla por igual a los biotipos no resistentes como resistentes a compuestos piretroides.
Para el cultivo de **Soja**, se aplicará con pulverizadoras terrestres, asperjando como mínimo 100 litros por hectárea, con el fin de lograr una buena cobertura (50-70 impactos/cm²). Utilizar presión entre 40-60 lbs/pg². Realizar una adecuada cobertura del cultivo según el estado de desarrollo del mismo y según la ubicación de la plaga. **CLORFENAPIR 24 DELTA AGRO®** actúa sobre todos los estadios larvales de *Anticarsia gemmatalis*, *Rachiplusia nu* y *Chrysodeixis includens*, pero se obtiene una eficacia máxima cuando las aplicaciones se dirigen a los primeros estadios larvales de las mismas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
TOMATE	Polilla del tomate <i>Tuta absoluta</i>	50 cm ³ / 100 lt de agua (*)	Ante aparición de la plaga.
ALGODÓN	Oruga de la hoja <i>Alabama argillacea</i>	830 cm ³ / ha (*)	Aplicar cuando se observan 15-20 larvas por metro de surco, preferentemente hasta L3 (larvas de 1,5-2 cm)
SOJA	Oruga de las leguminosas, <i>Anticarsia gemmatalis</i> Oruga medidora, <i>Rachiplusia nu</i> Falsa oruga medidora, <i>Chrysodeixis includens</i>	800 cm ³ / ha (*)	Aplicar cuando se observen 10-15 larvas por metro de surco. Larvas con tamaño < 1,5 cm (L2-L3). No realizar más de dos aplicaciones por ciclo de cultivo.

* Debe agregarse aceite emulsionable en la proporción de 0,3 % de volumen de aceite en volumen de caldo.

RESTRICCIONES DE USO: En **tomate** entre la última aplicación y cosecha deberán transcurrir 7 días y no debe superarse las cinco (5) aplicaciones en todo el ciclo de cultivo. En **algodón**, el uso es posicionado. Entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir 45 días en el cultivo de **soja**. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Tiempo de reingreso al área tratada: No ingresar al área tratada sin vestimenta de protección adecuada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas desde el momento de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **CLORFENAPIR 24 DELTA AGRO®** acaricida es compatible con la mayoría de los plaguicidas aplicados. En caso de duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD: Aplicado en el momento y a las dosis recomendadas, **CLORFENAPIR 24 DELTA AGRO®** no es fitotóxico para el cultivo de algodón ni el de tomates.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO



NOCIVO

